

KOLONOSKOPIE parciální = sigmoideoskopie

POPIS: toto vyšetření nahrazuje dříve používanou rigidní rektoskopií. Používá flexibilní přístroj délky 60 cm. Lze vyšetřit levý tračník cca do oblasti lineárního ohbí. Velmi detailně posoudí zánět, přítomnost polypů, divertikulů, zúžení v dané oblasti.

DOBA TRVÁNÍ: 5 minut.

PŘÍPRAVA: 2 klysmata Yal 1,5–2 hod. před vyšetřením, dieta není nutná.

ZÁTĚŽ PACIENTA: mírná, krátké pocity tlaku, nafouknutí.

VÝHODA: krátké bezpečné, nenáročné vyšetření nejrizikovější oblasti tračníku s vysokou výpovědní hodnotou. Ideální jako rychlé úvodní vyšetření pro drobnou enterorhagii – tj. krev na papíře, kapání do místy, jako úvodní vyšetření při průjmech k vyloučení ulcerosní kolitidy nebo jiného zánětu, při svědění a tlaku a bolesti v konečníku, u fissur...

Není nutné vyšetření koagulace a trombo!

Není nutná premedikace a doprovod!

NEVÝHODA: není určeno pro prevenci kolorektálního karcinomu v ČR.

KOLONOSKOPIE totální

VÝHODA: základní vyšetření při prevenci CRC kolorektálního karcinomu a pozit. vyš. OK. Možnost současného odstranění polypů a provádění léčebných výkonů dle patologie.

NEVÝHODA: vyšší náročnost pro pacienta, pocit plnosti, nafouknutí a tlaky po vyšetření, dietní opatření 2–3 dny před vyšetřením, náročnější příprava: vypítí 3–5 litrů tekutin.

TYPY PŘÍPRAVY: Fortrans 3–4 litry, fosfát 2× 75 ml a následně 2–3 litry tekutiny, Pico-prep, Moviprep – ochucené přípravky.

Odběr koagulace, trombo před vyšetřením.

PREMEDIKACE: Dolsin, Dormicum i.v., – nutnost odvozu a doprovodu, častější projevy hypotense, motání a oblužení...

Entonox inhalace – za 30 minut možno řídit automobil!

Vyšší procento komplikací – krvácení, perforace po polypektomiích a terapeutických zákrocích.



KOMPLETNÍ
PROKTOLOGICKÉ
OŠETŘENÍ
SPECIALISTOU

www.privgastro.cz

ANOSKOPIE

POPIS: vyšetření konečníku a análního kanálu v délce cca 6–7 cm anoskopem na levém boku nebo v gynekologické poloze.

Doba trvání: 2–3 minuty.

PŘÍPRAVA: 1al klysma nebo glycerin čípek, případně bez přípravy.

ZÁTĚŽ PACIENTA: minimální.

VÝHODY: detailní přehled oblasti hemoroidů, kanálu análního s posouzením případné píštěle, fissury...

NEVÝHODY: nelze vyloučit příčinu krvácení, zánětu, bolesti a patologii ve vlastním rektu cca nad 10 cm a v sigma-descendens.



MUDr. Petr Richter, CSc.
Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265

e-mail: info@privgastro.cz

www.privgastro.cz