



KOMPLETNÍ PROKTOLOGICKÉ OŠETŘENÍ SPECIALISTOU

www.privgastro.cz

ONEMOCNĚNÍ KONEČNÍKU...

V našem moderně vybaveném centru se specializujeme na léčbu hemoroidů. Patříme k nejlépe vybaveným pracovištím. Našemu zátkroku vždy předchází vyšetření pacienta, anamnesa, rozbor jeho obtíží. Po vyšetření sigmoideoskopem f. Pentax určíme rozsah, velikost hemoroidů a přítomnost prolapsu a dle nálezu doporučíme optimální metodu léčby.

Na rozdíl od operace, která je spojena s hospitalizací, nepříjemnými stavy po narkóze, pracovní neschopnosti jsou tyto metody ambulantní, velmi dobře snášené s minimální bolestivostí. Pacienta sledujeme v pravidelných intervalech a dle reakce výkony případně opakujeme s cílem odstranit tyto chouloustivé obtíže.

OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM HEMORON.

Při léčbě Hemoronem se aplikuje monofazický proud o intenzitě 8–16 mA na cévy hemoroidů. Následně vzniká suchá čistá aseptická nekroza cév a hemoroidů, atrofie, odloučení tkáně a vyhojení. Elektroléčbu užíváme pouze u vnitřních hemoroidů.



BARRONOVA LIGACE HEMOROIDŮ

Pomocí podtlaku je nasán uzel do čepičky přístroje a na bázi uzlu se aplikuje gumový kroužek. V průběhu ošetření se může aplikovat i několik kroužků. Ošetření se provádí bez anestezie, ambulantně. Kroužek zamezí přístupu krve do hemoroidu a po 5–10 dnech společně odpadnou s vytvořením jizvy a zpevněním uvolněné sliznice. Dle počtu hemoroidů se výkon může opakovat za 3–4 týdny v jiné lokalizaci.




Výkon je někdy doprovázen 1–2 dny neurčitým mírně bolestivým tlakem v konečníku. Podáváme analgetika a ledujeme. V ojedinělých případech je nutno nasadit antibiotika. Úspěšnost vylečení je až 80 % a z dlouhodobého hlediska se jedná o jednu z nejúčinnějších instrumentálních metod.



KOAGULACE INFRAČERVENÝM SVĚTLEM

Při ošetření se 1–1,5 vteřiny aplikuje na bazi hemoroidů infračervené světlo ve 4 až 5 mís-tech. Tepelným efektem světla se dosahuje uzavření krevního zásobení uzlu a jeho postupného zajízvení. Při ošetření pocitujete mírný pálivý tlak v konečníku. Celý zákrok se může opakovat za 3–4 týdny v jiné lokalizaci. Za 4 až 10 dní po zákroku se může objevit mírně krvácení při stolici. Metoda je vhodná pro drobné, krvácející hemoroidy.



**PŘIPRAVUJEME PRO VÁS PORADNU
PRO STŘEVNÍ INKONTINENCI!**

MUDr. Petr Richter CSc.
Husova 76, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 102 265
e-mail: info@privgastro.cz

www.privgastro.cz